


Instrucciones para el paciente después de la venopunción




Para disminuir los riesgos después de la recolección de sangre:

- El técnico le aplicará presión o le pedirá que usted aplique presión inmediata sobre el sitio de la punción.
- Una vez que le pongan el curita, déjeselo puesto por lo menos 2 horas.
- Evite toda actividad física, sobre todo levantar objetos pesados, por lo menos las siguientes 2 horas.

Si tiene algún síntoma relacionado a los riesgos de la recolección de sangre (como moretones o sangrado del sitio de la punción, un poco de malestar, cosquilleo en el brazo o hinchazón dolorosa), por favor llame a su médico de cabecera.

Instrucciones para el paciente después de la venopunción



Para disminuir los riesgos después de la recolección de sangre:

- El técnico le aplicará presión o le pedirá que usted aplique presión inmediata sobre el sitio de la punción.
- Una vez que le pongan el curita, déjeselo puesto por lo menos 2 horas.
- Evite toda actividad física, sobre todo levantar objetos pesados, por lo menos las siguientes 2 horas.

Si tiene algún síntoma relacionado a los riesgos de la recolección de sangre (como moretones o sangrado del sitio de la punción, un poco de malestar, cosquilleo en el brazo o hinchazón dolorosa), por favor llame a su médico de cabecera.